

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

SINTOMAS

- **DIARREA:** Es el síntoma más común. Puede estar relacionada con la gravedad y en ocasiones puede aparecer sangre, pus o moco.
- **DOLOR ABDOMINAL:** Se da en el 70% de los pacientes. A veces alivia tras la defecación.
- **RECTORRRAIA:** En la mitad de los pacientes con afectación del colon, y en el 25% de pacientes con enfermedad íleo-cólica
- **PERDIDA DE PESO:** Afecta al 60% de los pacientes por disminución de la ingesta y pérdida de proteínas
- **ANEMIA:** Por pérdida de hierro con los sangrados y/o falta de vitaminas por malabsorción.
- **FIEBRE:** Debida principalmente a la inflamación intestinal. La fiebre alta puede indicar la presencia de una infección (por ejemplo un absceso)
- **CANSANCIO y FATIGA**
- **ANOREXIA**
- **MASA ABDOMINAL**
- **TENESMO:** Urgencia, sensación de evacuación incompleta, dolor anal.
- **LESIONES ANALES:** (25-30%): Fisuras y úlceras
- **FÍSTULAS PERIANALES:** Aparecen en el 10% de los pacientes.

Aparecen manifestaciones extraintestinales en el 20-40% de los pacientes con EII:

- **En articulaciones:** espondilitis anquilosante, sacroileítis, artritis periférica
- **En piel:** pioderma gangrenoso, eritema nodoso
- **En ojos:** uveítis, escleritis, iritis
- **En el hígado:** colangitis esclerosante primaria (en CU)