


HIDRADENITIS SUPURATIVA

Es una enfermedad relativamente común, con una prevalencia estimada en torno al 0.7-1.2% en los estudios más recientes, siendo unas 3 veces más frecuente en las mujeres (aunque en los hombres suele ser más grave). La edad media de aparición se sitúa sobre los 20 años, siendo raro que la enfermedad comience antes de la adolescencia, etapa en la que las glándulas apocrinas empiezan a ser funcionales.

Con la evolución de la enfermedad, si no hay un buen control, la inflamación repetida produce cicatrices y túneles por debajo de la piel (llamadas fístulas), con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Algunos de los factores que pueden ser predisponentes en la enfermedad:



Factores medioambientales



Factores como el tabaco o la obesidad aumentan la inflamación

Factores genéticos




Se han encontrado algunas mutaciones genéticas en 1/3 de los pacientes

Factores infecciosos



Las sobreinfecciones pueden influir en los brotes, sobre todo cuando se forma el biofilm bacteriano

Factores hormonales



28 DÍAS

Algunas mujeres tienen brotes con las menstruaciones, otras cambios en el embarazo y otras mejoría con la menopausia



Factores inmunológicos



Células Th1 TNF- α

Algunas células y sus mediadores inflamatorios están sobreexpresados

HIDRADENITIS SUPURATIVA



El origen de la hidradenitis supurativa sigue siendo desconocido, aunque se ha asociado a diversos factores, tanto genéticos como medioambientales. Por tanto, es una enfermedad de origen multifactorial

