


RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA AL ALTA EN INYECCIÓN INTRAVITREA

¿QUÉ ES ?

Consiste en la administración de medicamentos en el ojo para tratar enfermedades oculares y proteger la visión.

Mediante una inyección, el medicamento se introduce en la cavidad vítrea, un espacio situado en la parte posterior del ojo, detrás del cristalino. Es frecuente la administración repetida de estos fármacos.



Se llevan a cabo en un lugar esteril y se utiliza anestesia tópica. Antes de proceder, se desinfecta el ojo y los párpados, en condiciones de asepsia.

DÍA DE INTERVENCIÓN

El día de la intervención debe administrarse: **TROPICAMIDA COLIRIO** una gota cada 15 minutos en el ojo a inyectar, en total 4 veces, empezando 1 hora antes de la inyección.

Se tomará **EDEMOX** 1 hora antes de la inyección.



Deberá acudir a la puerta principal del hospital a la hora que se le ha indicado.

El celador le acompañará al lugar donde se le preparará para la intervención.


RECOMENDACIONES AL ALTA



- PROCURAR NO AGACHAR LA CABEZA NI REALIZAR MOVIMIENTOS BRUSCOS.
- USO DE GAFAS OSCURAS: PARA PROTEGER LOS OJOS DE LA LUZ Y OTROS AGENTES EXTERNOS.
- ADMINISTRARSE COLIRIO PAUTADO SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SI PRECISA.
- EVITAR MAQUILLARSE DURANTE UN TIEMPO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN.
- ES NORMAL NOTAR MOLESTIAS EN EL OJO OPERADO O NO VER ADECUADAMENTE LOS PRIMEROS DÍAS.



- EVITE ESTAR EN CONTACTO CON ANIMALES Y HACER LABORES EN EL CAMPO.
- DEBERÁ PERMANECER LEJOS DE AMBIENTES CON HUMO O POLVO.
- NO DEBE BAÑARSE EN LA PISCINA O EN EL MAR.



- ACUDIR ACOMPAÑADO A LA INTERVENCIÓN.
- CONTAR CON EL APOYO DE UNA PERSONA DURANTE EL PERIODO DE RECUPERACIÓN.
- NO FROTARSE LOS OJOS.
- EVITAR ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN SACUDIDAS O TRAUMATISMOS OCULARES: COMO CORRER, HACER GIMNASIA, NO HACER ESFUERZOS, NI CARGAR PESO.
- EVITAR DORMIR DEL MISMO LADO DEL OJO OPERADO LOS PRIMEROS DÍAS.

SIGNOS DE ALARMA

- DOLOR AGUDO.
 - ENROJECIMIENTO DEL OJO CON O SIN DOLOR.
 - ABUNDANTES SECRECIONES AMARILLENTAS.
 - VISIÓN DOBLE.
 - NÁUSEAS, VÓMITOS.
 - VISIÓN DE NUEVAS MANCHAS FLOTANES O LUCES.
 - PÉRDIDA BRUSCA DE VISIÓN.
 - APARICIÓN DE SANGRADO.
- ACUDIR A SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O A URGENCIAS SI PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS

