



Manejo en persona consciente

-  Palidez
-  Taquicardia
-  Visión borrosa
-  Debilidad y temblor
-  Sudor



- Confusión 
- Hambre 
- Irritabilidad 
- Cansancio 
- Dolor de cabeza 

INGERIR 15G HC DE ABSORCIÓN RÁPIDA



15G DE GLUCOSA
gel
solución oral
tabletas



15G DE AZÚCAR



15ML DE MIEL
1 cucharada



175ML DE ZUMO
O BEBIDA AZUCARADA

Esperar 15 min  en reposo



Si glucemia es
MENOR de 70 mg/dl

**MEDIR
GLUCEMIA
CAPILAR**

Si glucemia es
MAYOR de 70 mg/dl



Si es hora de una
comida principal,
hazla.



Si falta más de una hora
para la comida principal:
comer HC de absorción lenta.

Patxi Ezkurra Loiola coordinador, Fundación redGDPS. Guía de actualización en diabetes tipo 2, 2017.
Disponible en http://www.redgdps.org/gestor/upload/2018/2017%20Guia_Patxi_bolsillo.pdf

Manejo en persona inconsciente

Glucagón intramuscular

- Reconstitución antes de aplicar.
- Aplicación intramuscular.
- Mantener refrigerado.



Glucagón intranasal

- Aplicación nasal.
- No necesita reconstitución
- No necesita inhalación.
- Una dosis única.
- Recomendado a partir de 4 años.
- Mantener a Tª ambiente.

